



الرقيم ٢١١١١١ التاريخ ٢٤٤٠/١١/٢٩ هـ 

معالى رنيس المركز الوطني للسكري والفد الصم والوراثة عطوفة أمين عام وزارة الصحة عطوقة مدير عام الخدمات الطبية الملكية عطوفة مدير عام دائرة الشراء الموحد عطوفة مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية عطوفة مدير عام مستشفى الملك عيدالله المؤسس الجامعي عطوفة مدير عام مستشفى الأمير حمزة عطوفة مدير عام مركز الحسين للسرطان عطوفة نقيب الاطباء رعطوفة نقيب الصيادلة السادة جمعية المستشفيات الخاصة السادة جمعية مالكي الصيدايات الخاصة

## الموضوع : تعميم Prucalopride

تحية طيبة ويعد ،،،

إشارة الى اجراءات السلطات الدوانية الاسترالية والكندية والامريكية بخصوص الادوية التي تحتوي على المادة العلمية (prucalopride) حيث تم التأكيد على معلومات مأمونية دوانية عند إستضدام هذه المستحضرات والتي نتضمن التالي:

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Suicidal Ideation and Behavior In clinical trials, suicides, suicide attempts, and suicidal ideation have been reported. A causal association between treatment with prucalopride and an increased risk of suicidal ideation and behavior has not been established. Monitor all patients treated with prucalopride for persistent worsening of depression or the emergence of suicidal thoughts and behaviors. Counsel patients, their caregivers, and family members of patients to be aware of any unusual changes in mood or behavior and alert the healthcare provider. Instruct patients to discontinue prucalopride immediately and contact their healthcare provider if they experience any of these symptoms.

ADVERSE REACTIONS

Suicidal Ideation and Behavior In the double-blind trials, one patient reported a suicide attempt 7 days after the end of treatment with prucalopride 2 mg once daily; none were reported in patients on placebo. In the open-label trials, two patients reported a suicide attempt and another patient reported suicidal ideation. Completed suicide was reported in two patients, previously treated with prucalopride 2 mg or 4 mg; both discontinued prucalopride for at least one month prior to the event.

علما أن المؤمسة تقوم بمتابعة نشرة المستحضر الاصيل المسجل Resolor Img, 2mg (prucalopride) tablet لأضافة تلك التحذيرات على نشرته الداخلية

Health care professionals and patients are encouraged to report adverse events or side effects to JFDA by using:

Website: www.ifda.jo

Mobile application: (Jordan fda)

Yellow card form.

وتفضلوا بقبول فانق الإحترام ،،،

الصريدلاتية ومبال الهقب مدير منيرية النواء の111mgmm

نسخة / قسم الاستخدام الرشيد - للمتابعة نعمشة / قسم التسجيل نعمشة / فسم التسجيل نسخة / ضابط ارتباط الموقع الالكتروني نسخة / الفاكس رز م جدر- 2019/07/30